

ОТЧЕТ о клинической апробации

«Оценка эффективности и переносимости лекарственного препарата Ваньтун Артиплас в лечении пациентов с дорсалгией»

Исследование проведено мною в амбулаторных условиях.

Дизайн исследования: 20 пациентов в возрасте от 30 до 72 лет, 7 мужчин и 13 женщин.

Ведущей патологией являлись: выраженные болевые проявления при дорсопатиях:

1. Шейного отдела позвоночника - 7 пациентов.
2. Грудного отдела позвоночника – 4 пациента.
3. Пояснично-крестцового отдела позвоночника – 8 пациентов
4. ДОО коленного сустава – 1 пациент.

Препарат Ваньтун Артиплас назначался в течение 6-8 дней, на фоне проводимой базисной терапии препаратами НПВС, миорелаксантами, седативными средствами, физиотерапевтическими процедурами, массажем и ЛФК.

Пластырь наклеивали на зону максимальной болезненности или напряжения мышц.

Процедуры проводились ежедневно или через день, наклеиванием пластыря на 12 – 16 часов.

За время исследования аллергических реакций на применение препарата – не отмечалось.

Оценка эффективности препарата проводилась через 7-10 дней от начала его применения.

По общему клиническому впечатлению и субъективному впечатлению пациентов отмечен выраженный положительный эффект от применения данного препарата, в виде:

- а) уменьшения болевого синдрома.
- б) уменьшения скованности мышц.
- в) расширения объема активных движений.

Положительный эффект от приема препарата отмечен у 80 % больных уже на 3-5й день лечения.

Гендерных различий в эффективности препарата не отмечено.

Вывод: Препарат Ваньтун Артиплас является высокоэффективным лекарственным препаратом для наружного применения как самостоятельного средства, так и в сочетании с другими противовоспалительными препаратами и физиотерапевтическими методами лечения.

Заслуженный врач России.

Невролог высшей квалификационной категории



ВН Божко.