

"Городская клиническая больница 38"

Стационар: ул. Чернышевского д. 22
<http://mlpu38.ru/> (831) 430-34-47

Отчет о применении лекарственного средства Ваньтун Артиплас на группе пациентов с дорсопатией поясничного отдела позвоночника.

Исследование проведено на базе неврологического отделения ГБУЗ НО ГКБ №38. Дизайн исследования: 30 стационарных пациентов, в возрасте от 30 до 62 лет (средний возраст - 42 года). С патологией поясничного отдела позвоночника, включавшей в себя рефлекторные синдромы - люмбагию, люмбоишиалгию, миалгию; остеоартрозом.

На момент исследования из терапии были исключены анальгетики, спазмолитики. Пациентам проводилась терапия лекарственным средством Ваньтун Артиплас в течении 14 дней: раз в сутки производилась аппликация пластыря на поясничный отдел, через каждые 24 часа пластырь заменялся на новый.

Оценка результатов эффективности проводилась спустя 14 дней, по бальной шкале: 0-нет эффекта; максимальная оценка 42 балла. Оценивалась выраженность болевого синдрома (10 баллов), выраженность миофасциального синдрома (8 баллов), подвижность поясничного отдела позвоночника (12 баллов), тонус мышц поясницы (6 баллов), субъективные ощущения пациента (6 баллов). Наивысшую эффективность (35-42 балла) препарат показал у 22 пациентов. Высокую эффективность (35 – 30 баллов) препарат показал у 5 пациентов. Среднюю эффективность (30-25 баллов) препарат показал у 3 пациентов, данные пациенты имеют в анамнезе остеоартроз пояснично-крестцового отдела позвоночника на протяжении более 10 лет. Средний балл по итогам исследования: 37,4. В ходе исследования побочные реакции выявлены не были, наивысшую эффективность препарат показал при купировании миофасциального синдрома. Препарат можно рекомендовать для амбулаторного и стационарного лечения пациентов с дорсопатиями различных этиологий.

Никитина Г.П.

Михалкова С.К.

Нуждина Н.В.

Сипова О.Ю.



Исполнители:
Заведующая отделением, врач высшей категории

Врач невролог

Врач невролог

Врач невролог

13 октября 2014 год